

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Вакцина паротитная культуральная живая

Вакцина для профилактики паротита

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

АО «НПО «Микроген»

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» _____ 100320 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав. Одна прививочная доза препарата содержит: <u>Действующие вещества:</u> - вирус паротита - не менее 20 000 (4,3 lg) тканевых цитопатогенных доз ТЦД₅₀. <u>Вспомогательные вещества:</u> - стабилизатор - смесь 0,08 мл водного раствора ЛС-18* и 0,02 мл 10 % раствора желатина; - гентамицина сульфат - не более 20 мкг. Примечание. *Состав водного раствора ЛС-18: сахараза – 250 мг, лактоза – 50 мг, натрий глутаминовокислый – 37,5 мг, глицин – 25 мг, L-пролин – 25 мг, Хенкса сухая смесь с феноловым красным – 7,15 мг,	Состав. Одна прививочная доза препарата содержит: <u>Действующие вещества:</u> - вирус паротита - не менее 20 000 (4,3 lg) тканевых цитопатогенных доз ТЦД₅₀. <u>Вспомогательные вещества:</u> - стабилизатор - смесь 0,08 мл водного раствора ЛС-18* и 0,02 мл 10 % раствора желатина; - гентамицина сульфат** - не более 0,5 мкг. Примечание. *Состав водного раствора ЛС-18: сахараза – 250 мг, лактоза – 50 мг, натрий глутаминовокислый – 37,5 мг, глицин – 25 мг, L-пролин – 25 мг, Хенкса сухая смесь с феноловым красным – 7,15 мг,

Старая редакция	Новая редакция
вода для инъекций до 1 мл.	вода для инъекций до 1 мл. ** Технологическая примесь.

Начальник управления регистрации
и медицинских исследований
АО «НПО «Микроген»



А.Е. Ершов