

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

**Растворитель для коревой и паротитной вакцин
культуральных живых сухих**

Торговое наименование лекарственного препарата. Растворитель для коревой и паротитной вакцин культуральных живых сухих

Лекарственная форма. Растворитель для приготовления вакцин для инъекций

Состав.

1 доза (0,5 мл) содержит:

натрия хлорида - 4,0 мг

калия хлорида - 0,2 мг

магния сульфата гептагидрата - 0,05 мг

магния хлорида гексагидрата - 0,05 мг

калия дигидрофосфата - 0,03 мг

натрия гидрофосфата додекагидрата - 0,06 мг

кальция хлорида гексагидрата - 0,07 мг

воды для инъекций - до 0,5 мл

Описание: Прозрачная бесцветная жидкость.

Характеристика препарата: Растворитель для коревой и паротитной вакцин культуральных живых сухих представляет собой растворенную в воде для инъекций смесь неорганических солей, стерильный.

Фармакотерапевтическая группа: МИБП – растворитель.

Код АТХ: V07AB

Показания для применения. Используется в качестве растворителя для коревой и паротитной вакцин культуральных живых сухих.

Противопоказания для применения

Не выявлены.

Меры предосторожности при применении. Не пригоден к применению растворитель в ампулах с нарушенной целостностью, маркировкой, а также при изменении физических свойств (цвета, прозрачности и др.), с истекшим сроком годности, неправильно хранившийся.

Применение беременными женщинами, женщинами в период грудного вскармливания, детьми, взрослыми, имеющими хронические заболевания.

Растворитель используется в соответствии с инструкцией по медицинскому применению разводимого лекарственного средства.

Режим дозирования, способы введения и применения. Непосредственно перед использованием одной из вакцин, в ампулу с препаратом вносят растворитель из расчета 0,5 мл растворителя на одну прививочную дозу вакцины. Вскрытие ампулы осуществляют при строгом соблюдении правил асептики. Ампулы в месте надреза обрабатывают 70 %-ным этиловым спиртом и обламывают, не допуская при этом попадания спирта в ампулу. Из ампулы с растворителем отбирают необходимый объем и переносят в предварительно вскрытую ампулу с сухой вакциной.

Вскрытая ампула с растворителем, так же, как и вакцина, должна использоваться немедленно и хранению не подлежит.

Возможные нежелательные реакции при применении. Не выявлены.

Симптомы передозировки, меры по оказанию помощи при передозировке. Случаи передозировки не установлены.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не установлено

Форма выпуска. В ампулах по 0,5 мл, 1,0 мл или 2,5 мл.

10 ампул в пачке из картона вместе с инструкцией по применению и скарификатором ампульным (если необходим).

Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Не оказывает влияние на способность к вождению автомобиля или управлению машинами и механизмами.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре от 2 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Указание специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованных лекарственных препаратов. Уничтожение неиспользованного растворителя осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Класс А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

Условия отпуска. Для лечебно-профилактических учреждений.

Производитель/организация, принимающая претензии

Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора), 630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, тел. (383) 363-47-00 доб. 28-34, факс (383) 336-74-09, e-mail: vector@vector.nsc.ru.

Генеральный директор

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора



Р.А. Максютков